ESCOLA ESTADUAL
FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO

Turma: _____

VALOR:

Data: ____/____/____

PROFESSOR:

ALUNO (A):

MATRIZES E DETERMINANTES

TIPOS DE MATRIZES

MATRIZ QUADRADA

È aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas

Ex.:

$$1^{\circ}) A = [-5]_{1 \times 1}$$

$$2^{\circ}) B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{7} \\ -9 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$3^{\circ}) C = \begin{bmatrix} 0 & 8 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \\ \frac{8}{3} & \sqrt{5} & -2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Diagonal principal e diagonal secundária de uma matriz quadrada

$$\text{Ex.: } B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 0 & 7 & -9 \\ 5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

↙
Diagonal secundária

↘
Diagonal principal

MATRIZ LINHA

È aquela que possui apenas uma linha.

Ex.:

$$1^{\circ}) A = [0 \ 3 \ 1 \ -7] \text{ matriz linha } 1 \times 4$$

$$2^{\circ}) B = \left[\frac{2}{5} \ 0 \ -\sqrt{3} \right] \text{ matriz linha } 1 \times 3$$

MATRIZ COLUNA

È aquela que possui apenas uma coluna

$$1^{\circ}) A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} \text{ matriz coluna } 3 \times 1$$

$$2^\circ) B = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ matriz coluna } 2 \times 1$$

MATRIZ NULA

A matriz é nula se e somente se todos os seus elementos são iguais a zero ($a_{ij} = 0$)

$$\text{Ex.: } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

MATRIZ TRANSPOSTA

Dada uma $A_{m \times n}$, a matriz transposta de A (indica-se A^t) é aquela $n \times m$ que se obtém trocando **ordenadamente** suas linhas por colunas ou suas colunas por linhas.

Ex.:

$$1^\circ) \text{ Sendo } A = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 1 & 0 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2}, \text{ então } A^t = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 8 \\ -5 & 0 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

MATRIZ OPOSTA

Chama-se **oposta** de uma matriz A, a matriz $-A$ que se obtém trocando o sinal de todos os elementos de A.

$$\text{Ex.: } A \text{ oposta de } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & -4 & 5 \end{bmatrix} \text{ é } -A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

MATRIZ IDENTIDADE

A matriz quadrada de ordem n onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a zero, chama-se **matriz identidade**.

$$\text{Ex.: } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

OPERACÕES COM MATRIZES

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MATRIZES

EXEMPLOS:

$$1^\circ) \quad \text{Sendo } A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 10 \\ 3 & -3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \text{então}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 4+7 & 5+(-1) & 7+10 \\ 2+3 & -1+(-3) & 0+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 4 & 17 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

2^\circ)

$$A - B = A + (-B) = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 1 & -10 \\ -3 & 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+(-7) & 5+1 & 7+(-10) \\ 2+(-3) & (-1)+3 & 0+(-5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -3 \\ -1 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

MULTIPLICAÇÃO DE UMA MATRIZ POR UM NÚMERO REAL

$$\text{Ex.: } 7 \cdot \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \cdot 4 & 7 \cdot (-6) \\ 7 \cdot 0 & 7 \cdot \left(\frac{1}{7}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & -42 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

Ex.:

$$1^\circ \text{ Sejam } A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 2}, \text{ calcule } A \cdot B:$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot 4 & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 7 \\ 2 \cdot 2 + 5 \cdot 4 & 2 \cdot 5 + 5 \cdot 7 \\ 4 \cdot 2 + 7 \cdot 4 & 4 \cdot 5 + 7 \cdot 7 \end{bmatrix} \Rightarrow A \cdot B = \begin{bmatrix} 10 & 22 \\ 24 & 45 \\ 36 & 69 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$2^\circ (1 \ 7)_{1 \times 2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 & 8 \\ 9 & 5 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = (1 \cdot 3 + 7 \cdot 9 \quad 1 \cdot 4 + 7 \cdot 5 \quad 1 \cdot 8 + 7 \cdot 2) = (66 \ 39 \ 22)_{1 \times 3}$$

DETERMINANTES

A qualquer matriz quadrada de ordem n, podemos associar um único número chamado determinante da matriz.

O determinantes devem ser representados por barras verticais.

CÁLCULO DO DETERMINANTE DE UMA MATRIZ DE 1ª ORDEM

$$A = [a_{11}] \Rightarrow \det A = |a_{11}| = a_{11}$$

$$\text{Ex.: } A = [5] \Rightarrow \det A = |5| = 5$$

CÁLCULO DO DETERMINANTE DE UMA MATRIZ DE 2ª ORDEM

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

-

+

Ex.: Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ determine o determinante de A.

$$\det A = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = (-2) \cdot 2 - 3 \cdot 4 = -4 - 12 = -16$$

CALCULO DO DETERMINANTE DE UMA MATRIZ DE 3ª ORDEM

(regra de SARRUS)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- - - + + +

- Acrescentar as 2 primeiras colunas à direita da 3ª
- Adicionar os produtos dos elementos da diagonal principal e das diagonais paralelas
- Subtrair os produtos dos elementos da diagonal secundária e das diagonais paralelas

Ex.: Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 8 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ calcule o determinante da matriz A.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 8 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-8 - 4 + 30) - (-24 + 2 - 10) = 18 - (-32) = 18 + 32$$

$$= -24 \quad 2 \quad -10 \quad -8 \quad -4 \quad 30 = 50$$

Obs: Faça os exercícios propostos.

ATIVIDADES

1) Escreva na forma de tabela as seguintes matrizes:

a) $A = (a_{ij})_{3 \times 1}$, sendo $a_{ij} = i \cdot j$

b) $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$, sendo $b_{ij} = 2i - j$

2) Construa a matriz real quadrada A de ordem 3, definida por:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2i + j & \text{se } i < j \\ i^2 - j + 1 & \text{se } i \geq j \end{cases}$$

3) Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 11 \\ 2 & 1 & 2 & 12 \\ 3 & 6 & 3 & 13 \\ 4 & 8 & 0 & 14 \\ 5 & 9 & 5 & 15 \end{bmatrix}$

- a) Qual é a ordem de A ?
 b) Escreva o elemento a_{52}
 c) Escreva a sua transposta.
 d) Para que valores de i tem-se $a_{ij} = 0$?

4) Calcule x e y , sabendo que :

$$\begin{bmatrix} x^2 & y^3 \\ x^2 & y^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x & -y \\ 4x & 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

5) Determine a matriz oposta das seguintes matrizes:

a) $A = \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ b) $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$ c) $C = \begin{bmatrix} 5 & -\frac{1}{4} \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

6) Dadas as matrizes $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$, sendo $a_{ij} = i^j$ e $B = [b_{ij}]_{2 \times 2}$ sendo $b_{ij} = j^i$, determine :

- a) $a_{11} + b_{11}$ c) $a_{21} \cdot b_{21}$
 b) $a_{12} - b_{21}$ d) $a_{22}(b_{11} + b_{22})$

7) Calcule $\sum_{i=1}^{10} (i^2 - 20)$

8) Das as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, determine:

- a) $A + B$ b) $B - C$ c) $2A + B$ d) $A - 3B + C$ e) $-4A + 3B + 2C$

6) Efetue:

a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

7) Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \text{ calcule :}$$

a) A^2 c) $A^2 \cdot B$

b) A^3 d) $B^2 \cdot A$

8) Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, calcule $A^2 + 2A - 11 \cdot I$, onde $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$